P/1

L'academie m'a chargé de luy faire le rapport de 2 observations envoyées par Mr Sauvet m^tre en chirurgie

La 1ère à pour objet une excrescence charnue, mobile, d'une figure conoïde d'un pouce de longueur, et de la largeur d'une pièce de vingt quatre sols a sa baze, sur la partie moyenne du coronal d'un enfant qui venoit de naître.

Mr Sauvet l'emporta avec le bistouri en ménageant une ligne de sa baze ; il y eut une legere hémorrhagie qu'il arrêta avec un plumaceau trempé dans l'Eau styptique, elle fut guérie en 15 jours.

il n'a pas, dit il, enlevé toute la tumeur afin de laisser aux vaisseaux qu'il coupoit un soutient par le moyen duquel on puisse les appercevoir soit pour y faire une compression plus immediate, soit pour y appliquer les astringens et par là, éviter une hémorrhagie plus considérable ; cet précaution que mr Sauvet prit de laisser une ~~ligne~~ portion de la tumeur pour arrêter l'hémorrhagie est plus nuisible qu'utile en ce qu'il faut que la fonte de cette partie se fasse, de là, la suppuration plus abondante, la cicatrice plus longue à obtenir ; d'ailleurs la finesse de ses filets arteriels, et le point d'appui que fournit le coronal devoit le rassurer sur sa crainte

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 49 n° 113

2e observation

Le 26 mars 1768 une fille agée de 15 ans, tomba sur un morceau de bouteille cassée et se coupa la partie inferieure laterale exterieure de l'avant bras, les tendons extenseurs des doigt annulaire et du petit doigt furent entierement divisés; Mr Jauvet fut mandé pour donner ses soins a cette fille et appliqua l'appareil demaniere quil pouvoit rapprocher les extremités des tendons, et les maintenir, le 18eme jour de l'accident la playe se trouva cicatrisée, et les doigts jouissoient de leur mouvements.

3eme observation

Il expose dans la 3eme observation une playe faite par un coup de hache qui divisa le soulier et les deux phalanges du gros orteil selon leur longueur, d'un homme qui fendoit du bois, Mr Jauvet fit un bandage unissant des pansemens bien ménagés remedierent à un leger gonflement qui survint, le malade reprit ses exercices le 30eme jour.

Mr Jauvet s'est conduit en bon praticien dans cette maladie ainsi que dans la precedente

4^{eme} observation

La 4^{eme} observation à pour objet une playe faite par un coup de couteau à la partie laterale externe du genou dans laquelle une partie du ligamment capsulaire fut divisé et une partie du bord lateral externe de la rotule separée du reste de l'os, et resta attachée à un lambeau des teguemens ; Mr Sauvet rapprocha les parties divisées et les y maintient par un bandage unissant, le 7^{eme} jour il leva l'appareil et apperçut une legere separation dans la playe et un leger gonflement inflammatoire sur la partie superieure du perone, il appliqua sur cet os un plumaceau de beaume d'arceus, et sur le reste de la playe un autre de cerat de Galien &c le 9^{eme} jour il observa sur le plumaceau du perone plusieurs petites ecailles brunes qui luy indiquerent l'exfoliation de la surface découverte du perone il y substitua alors le beaume de fioraventy jusqu'au 14 que ces exfoliations cesserent, et le malade fut parfaitement guerí le 32^{eme} jour. —

il y a tout lieu de croire que cette playe etoit simple et qu'elle ne penetroit pas dans l'articulation, Mr Sauvet auroit dû preferer d'abord le beaume fioraventy à celuy d'arceus sur la partie découverte du perone ; de plus jai de la peine a me persuader qu'au bout de 9. jours de la playe on ait pu observer une exfoliation a la partie superieure du perone et que le 14 il n'y parroissoit plus elles ne se font ny se terminent si promptement —

5eme observation

Le 12 may 1769 Mr Sauvet fut mandé pour voir un enfant de trois ans qui avoit a la machoire superieure du côté droit une double dent Canine, dont la pointe avoit percée, et traversée la levre; il fit faire l'extraction de la dent et fit l'operation du bec de lievre avec le bistouri et ne se servit point d'aiguilles, le petit malade fut gueri au bout de 15 jours. —

On pouvoit representer a Mr Sauvet qu'il à tres bien fait et en bon praticien l'operation du bec de lievre; mais qu'il auroit pu, dans ce cas, guerir son malade plus simplement en scarifiant, ou en entaurant avec un caustique la circonference du trou; mais il prévient cette objection en disant qu'il craignoit de causer par ces moyens une cicatrice difforme, et peut etre une fistule. —

Mr Sauvet est un bon chirurgien qui peut Donner des observations tres interessantes, mais cellesy ne peuvent êtres d'aucunne utilité à l'academie.

ce 5. may 1770. Pouteau
2e